

**Leukerfeld et Alte Rhone  
grand site ornithologique**

Pochon Pierre-André

**2015**



Liste non exhaustive mais démonstrative de la richesse des espèces nicheuses ou de passage dans la région du Leukerfeld.

Source : [www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/les-oiseaux-de-suisse/](http://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/les-oiseaux-de-suisse/)

Pierre-André Pochon  
Formateur d'adultes  
+41788017659  
[papochon@romandie.com](mailto:papochon@romandie.com)

## Aigrette garzette

*Egretta garzetta*



plumage nuptial (© Marcel Burkhardt)



adulte (© Mathias Schäf)

### Informations

Il n'y a pas si longtemps, l'apparition de ce gracieux héron blanc était un événement exceptionnel dans le paysage helvétique. L'extrême délicatesse de ses plumes a failli causer sa perte, car elles étaient très recherchées par les modistes du XIXe siècle. Son plumage de noces est caractérisé par une huppe formée de deux longs filaments retombant sur la nuque, un panache de franges sur la poitrine et une superbe traîne ciselée partant des épaules. Bien que la Garzette soit devenue plus fréquente au cours des deux dernières décennies, son arrivée printanière reste pleine de charme et d'exotisme. La Garzette est surtout observée au printemps et en été alors que la Grande Aigrette se voit principalement en automne et en hiver.

### Statut (en CH)

migrateur régulier, peu fréquent; hivernant et estivant accidentel

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

-

### Comportement migrateur

essentiellement migrateur au long cours

Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne

### Taille (cm)

55-65

### Envergure (cm)

88-95

### Poids (g)

450-550

### Site de nidification

arbres, buissons, roseaux

### Nourriture

insectes, poissons, crustacés, amphibiens

### Groupe

Hérons, Butors, etc.

### Habitat

zones humides, lacs, cours d'eau



## Alouette des champs

*Alauda arvensis*



adulte (© Mathias Schäf)

### Informations

Aux heures chaudes de la journée, lorsque la plupart des oiseaux sont accablés par le soleil, l'infatigable Alouette des champs grisolle encore haut dans le ciel comme pour affirmer son ardeur à vivre. Le flot continu de trilles et de babils ponctués d'imitations est délivré par le mâle en vol nuptial ascensionnel, montant si haut qu'il n'est plus qu'un point imperceptible à l'oeil nu, avant de retomber comme une pierre jusqu'à son point de départ.

### Statut (en CH)

nicheur et migrateur régulier, fréquent; hivernant peu fréquent

### Calendrier annuel

L'illustration montre sur la première ligne à quelles saisons l'espèce est régulièrement vue en Suisse. Selon la saison, le nombre d'individus peut subir de grandes variations. La ligne du milieu indique les périodes normales de migration. La dernière ligne donne la période durant laquelle l'espèce niche habituellement. Elle englobe en général la phase allant de la ponte des oeufs jusqu'à l'envol des jeunes.



### Effectif en Suisse (couples)

40'000 - 50'000 (2004)

### Comportement migrateur

essentiellement migrateur à courte distance

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne et nocturne

### Taille (cm)

18-19

### Envergure (cm)

30-36

### Poids (g)

33-45

### Site de nidification

sol

### Nourriture

insectes, graines

### Groupe

Alouettes

### Habitat

zone agricole



## Balbuzard pêcheur

*Pandion haliaetus*



adulte (© Mathias Schäf)

### Informations

L'oeil bandé par un foulard lui donnant un air de corsaire aux multiples exploits, le Balbuzard est l'un des rapaces les plus démonstratifs, prodigue de vertigineuses scènes de pêche: après une chute en piqué, il projette ses énormes pattes en avant et déploie ses ailes juste avant l'impact, faisant jaillir l'écume. Ses serres démesurément longues et recourbées agrippent les poissons les plus lisses, ce qui n'est pas sans risque pour le prédateur: il disparaît parfois entièrement sous l'eau et il peut arriver qu'il se noie en restant accroché à un poisson trop lourd.

### Statut (en CH)

nicheur disparu, migrateur régulier, peu fréquent; estivant accidentel

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

0 (2008-2012)

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne

### Taille (cm)

52-60

### Envergure (cm)

152-167

### Poids (g)

1200-2050

### Site de nidification

arbres, pylônes

### Nourriture

poissons

### Groupe

Balbuzard

### Habitat

lacs, cours d'eau



## Busard des roseaux

*Circus aeruginosus*



mâle (© Mathias Schäf)



femelle (© Mathias Schäf)

### Informations

A peine plus haut que la cime des roseaux, le vol chaloupé du Busard des roseaux en chasse ne passe pas inaperçu: le sombre pilleur masqué provoque à chaque allée et venue l'émoi chez les habitants des marais, bien compréhensible avec une telle épée de Damoclès planant au-dessus de leur tête.

### Statut (en CH)

nicheur très rare; migrateur régulier, peu fréquent, hivernant rare



### Effectif en Suisse (couples)

0 (2008-2012)

### Comportement migrateur

essentiellement migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne

### Taille (cm)

48-56

### Envergure (cm)

115-140

### Poids (g)

400-800

### Site de nidification

sol

### Nourriture

amphibiens, petits mammifères, oiseaux

### Groupe

Milans, Vautours, Buses et alliés

### Habitat

zones humides, lacs, zone agricole



## Bergeronnette grise

*Motacilla alba*



mâle nuptial (© Marcel Burkhardt)



plumage internuptial (© Mathias Schäf)

### Informations

Les noms d'oiseaux ne sont qu'une affaire de mode: autrefois appelée «lavandière» en raison de son attrait pour l'eau, puis «hochequeue» en référence à son tic, on lui a finalement préféré le qualificatif de «bergeronnette». Celui-ci sied bien à une habituée des rivages, bien qu'elle soit très éclectique dans le choix de ses habitats. C'est la deuxième espèce non forestière la plus fréquente derrière le Rougequeue noir, et son penchant pour les habitations rurales en fait une des mieux connues du grand public.

### Statut (en CH)

nicheur et migrateur régulier, fréquent; hivernant peu fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

100'000 - 150'000 (2004)

### Comportement migrateur

essentiellement migrateur à courte distance

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne et nocturne

### Taille (cm)

17-19

### Envergure (cm)

25-30

### Poids (g)

19-27

### Site de nidification

bâtiments

### Nourriture

insectes, araignées

### Groupe

Pipits et Bergeronnettes

### Habitat

lacs, cours d'eau, zones humides, zone agricole, agglomérations



## Bihoreau gris

*Nycticorax nycticorax*



adulte (© Mathias Schäf)



plumage juvénile (© Beat Rüegger)

### Informations

Lors de leur arrivée en avril, les petits groupes de Bihoreaux cachés dans les saules sont sans doute tout aussi amusants à rechercher que les oeufs de Pâques! Immobiles pendant la journée, ils se reposent de leur migration nocturne dans les arbres au bord de l'eau et ne s'envolent qu'à la nuit tombée, à moins d'être dérangés. Ce héron trapu doit son nom scientifique de «corbeau de nuit» à son croassement et à ses moeurs nocturnes qui le font souvent passer inaperçu.

### Statut (en CH)

nicheur irrégulier, rare; migrateur régulier, rare

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

0 - 1 (2008-2012)

### Comportement migrateur

essentiellement migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur nocturne

### Taille (cm)

58-65

### Envergure (cm)

105-112

### Poids (g)

500-700

### Site de nidification

arbres, buissons, roseaux

### Nourriture

amphibiens, poissons, insectes

### Groupe

Hérons, Butors, etc.

### Habitat

zones humides, lacs, cours d'eau



## Blongios nain

*Ixobrychus minutus*



mâle adulte (© Ruedi Aeschlimann)



plumage juvénile (© Marcel Burkhardt)


### Informations

Le timide acrobate habitué au grand écart entre les roseaux n'est guère démonstratif de son agilité, se tenant le plus souvent caché au coeur de la roselière. Plus aérien que son cousin le Butor étoilé, il peut monter jusqu'au sommet des tiges et se déplace volontiers en vol, raison pour laquelle sa présence est relativement facile à détecter. Le chant du mâle est un coassement sourd et bref ressemblant au lointain aboiement d'un chien, répété à intervalles réguliers, difficile à distinguer dans le concert des grenouilles.

### Statut (en CH)

nicheur et migrateur régulier, rare

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

80 - 120 (2004)

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur nocturne

### Taille (cm)

33-38

### Envergure (cm)

52-58

### Poids (g)

140-160

### Site de nidification

roseaux

### Nourriture

poissons, insectes, amphibiens, limaces

### Groupe

Hérons, Butors, etc.

### Habitat

zones humides, lacs, cours d'eau



## Bruant jaune

*Emberiza citrinella*



mâle (© Marcel Burkhardt)



femelle (© Marcel Burkhardt)

### Informations

Les richesses naturelles ne faisant apparemment pas partie des éléments à prendre en compte dans la « mise en valeur » de nos campagnes, l'amoureux des haies basses de buissons épineux qu'est le Bruant jaune a vu son habitat disparaître avec les remaniements parcellaires. Mais qui peut reproduire l'atmosphère créée par les notes égrenées avec simplicité, sur un ton tantôt résigné, tantôt optimiste de cet oiseau rayonnant, si caractéristique des paysages ruraux?

### Statut (en CH)

nicheur, migrateur et hivernant régulier, fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

50'000 - 80'000 (2004)

### Comportement migrateur

sédentaire et migrateur à courte distance

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne

### Taille (cm)

16-17

### Envergure (cm)

23-29

### Poids (g)

24-30

### Site de nidification

sol, strate herbacée et buissons

### Nourriture

graines, insectes

### Groupe

Bruants

### Habitat

haies, lisières, zone agricole, terrains vagues, zones humides



## Butor étoilé

*Botaurus stellaris*



adulte (© Ruedi Aeschlimann)

### Informations

La rencontre avec le fantôme solitaire des roselières n'est jamais banale: son plumage cryptique et ses moeurs crépusculaires l'enveloppent de mystère, si bien que ce sont souvent les traces qu'il laisse dans la neige qui trahissent sa présence. Difficile à repérer en raison de son plumage de couleur paille orné de chevrons noirs, il est passé maître dans l'art du camouflage: lorsqu'il se sent menacé, il pointe le bec vers le ciel, le cou tendu au maximum, se fondant ainsi entre les tiges de roseaux dont il va même jusqu'à imiter le mouvement en se balançant. Il fixe l'intrus en louchant sous le bec, et peut alors être approché de près.

### Statut (en CH)

migrateur et hivernant régulier, rare

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

-

### Comportement migrateur

migrateur à courte distance

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur nocturne

### Taille (cm)

70-80

### Envergure (cm)

125-135

### Poids (g)

900-1100

### Site de nidification

roseaux

### Nourriture

poissons, petits mammifères, amphibiens

### Groupe

Hérons, Butors, etc.

### Habitat

zones humides, lacs, cours d'eau



## Caille des blés

*Coturnix coturnix*



adulte (© Ruedi Aeschlimann)

### Informations

Si le chant de la Caille des blés - le «paie-ttes-dettes» des paysans - retentissait jadis communément dans nos campagnes, il n'est plus aujourd'hui connu que des initiés. Elle est si discrète, se tenant toujours cachée dans les hautes herbes, qu'il faut vraiment un coup de chance pour l'apercevoir. Préférant se tapir au sol plutôt que fuir, elle ne s'envole qu'au dernier moment; catapultée en l'air, elle se transforme alors en obus lancé à pleine vitesse.

### Statut (en CH)

nicheur et migrateur régulier, peu fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

1'500 - 2'000 (2004)

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur nocturne

### Taille (cm)

16-18

### Envergure (cm)

32-35

### Poids (g)

70-135

### Site de nidification

sol

### Nourriture

graines, insectes

### Groupe

Faisans et alliés

### Habitat

zone agricole



## Crabier chevelu

*Ardeola ralloides*



plumage nuptial (© Ruedi Aeschlimann)    plumage internuptial (© Ruedi Aeschlimann)


### Informations

Difficile à repérer lorsqu'il est posé dans les roseaux, ce petit héron discret surprend par son envol éclatant de blancheur qui rappelle celui d'une aigrette. C'est un oiseau tropical qui n'atteint que rarement la Suisse au printemps, dans le prolongement de sa migration qui le ramène vers ses sites de nidification méditerranéens. Cette espèce a beaucoup souffert de l'attrait de l'Homme pour son plumage, surtout à la fin du XIXe siècle.

### Statut (en CH)

migrateur régulier, rare

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

-

### Comportement migrateur

essentiellement migrateur à courte distance

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne et nocturne

### Taille (cm)

40-49

### Envergure (cm)

71-80

### Poids (g)

250-300

### Site de nidification

arbres, buissons, roseaux

### Nourriture

insectes, amphibiens, poissons

### Groupe

Hérons, Butors, etc.

### Habitat

zones humides, lacs, cours d'eau



## Etourneau sansonnet

*Sturnus vulgaris*



plumage nuptial (© Marcel Burkhardt)



plumage internuptial (© Ruedi Aeschlimann)

### Informations

L'Etourneau sansonnet a si mauvaise presse que l'élégance de l'oiseau, aux reflets métalliques tantôt émeraude, tantôt mauve parsemé de chevrons de bronze, ébahit le novice. Les traditionnelles nuées évoluant tels des bancs de poissons au-dessus des vignobles en automne constituent un spectacle fascinant, même pour les esprits chagrins réticents au partage des vendanges. Ce squatteur sans-gêne de cavités d'arbres, au détriment des pics qui les ont forées et d'autres oiseaux cavernicoles, mérite pourtant un peu d'indulgence pour ses bienfaits, comme l'élimination des diptères qui tourmentent le bétail. Cet imitateur hors pair adore plagier le Lorient, comme s'il prenait un malin plaisir à faire croire à la présence de l'oiseau jaune dans les branchages nus de mars.

### Statut (en CH)

nicheur et migrateur régulier, fréquent; hivernant peu fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

150'000 - 220'000 (2004)

### Comportement migrateur

essentiellement migrateur à courte distance

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne et nocturne

### Taille (cm)

19-22

### Envergure (cm)

37-42

### Poids (g)

75-90

### Site de nidification

cavités d'arbres, bâtiments

### Nourriture

insectes, vers, baies, fruits, graines

### Groupe

Etourneaux

### Habitat

zone agricole, vergers, agglomérations



## Faucon crécerelle

*Falco tinnunculus*



mâle (© Mathias Schäf)

### Informations

La silhouette du Faucon crécerelle épinglée dans le ciel, dite en «Saint-Esprit», est une vision familière dans la campagne, notamment audessus des talus de route ou de chemin de fer. Le corps presque vertical, les ailes frémissantes et la longue queue écartée servant de stabilisateur pour immobiliser la tête, cet amateur de petits rongeurs scrute méthodiquement le terrain en changeant régulièrement de point de fixation.

### Statut (en CH)

nicheur et migrateur régulier, fréquent; hivernant peu fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

3'000 - 5'000 (2009)

### Comportement migrateur

sédentaire et migrateur à courte distance

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne

### Taille (cm)

32-35

### Envergure (cm)

71-80

### Poids (g)

190-300

### Site de nidification

anfractuosités rocheuses, bâtiments, arbres

### Nourriture

petits mammifères, oiseaux, insectes

### Groupe

Faucons

### Habitat

zone agricole, agglomérations, montagne



## Faucon kobez

*Falco vespertinus*



mâle (© Marcel Burkhardt)



femelle (© Ruedi Aeschlimann)

### Informations

Coloré comme un perroquet, le gracieux Kobez fait figure d'exotique parmi nos faucons. Originaire des steppes orientales, c'est un grand voyageur qu'on ne voit pratiquement qu'au mois de mai, lorsqu'il revient de sa migration en boucle à travers toute l'Afrique et qui se calque sur celle des criquets migrateurs. Cerclant lentement dans le ciel, les petits faucons capturent les insectes au vol, alternant planées et coups d'ailes souples.

### Statut (en CH)

migrateur régulier, rare

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

-

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne

### Taille (cm)

28-34

### Envergure (cm)

65-76

### Poids (g)

115-200

### Site de nidification

arbres

### Nourriture

insectes

### Groupe

Faucons

### Habitat

zones humides, zone agricole



## Fauvette grisette

*Sylvia communis*



mâle (© Ruedi Aeschlimann)



femelle (© Beat Rügger)


### Informations

Elle ne demande presque rien, la Grisetette, quelques ronces entourées d'herbes folles suffisent à son bonheur. Mais son idéal ne cadre malheureusement pas avec celui du « propre en ordre » helvétique, qui ne laisse aucun répit aux moindres broussailles. Comme si un malheur ne suffisait pas, cette fauvette autrefois très commune - comme l'indique son nom scientifique - a vu ses populations s'effondrer suite à la terrible sécheresse qui a sévi au Sahel pendant l'hiver 1968/69. L'état de nos campagnes, où les haies ont disparu au rythme des remaniements parcellaires et des améliorations foncières, ne lui a jamais permis de se rétablir complètement chez nous.

### Statut (en CH)

nicheur régulier, peu fréquent; migrateur fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

1'000 - 2'000 (2004)

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur nocturne

### Taille (cm)

13-15

### Envergure (cm)

19-23

### Poids (g)

12-18

### Site de nidification

buissons

### Nourriture

insectes

### Groupe

Fauvettes et alliés

### Habitat

haies, gravières



## Gallinule poule-d'eau

*Gallinula chloropus*



adulte (© Beat Rügger)

### Informations

La vraie Poule d'eau, celle des initiés, est bien plus rare, farouche et discrète que la Foulque macroule sur nos lacs. Toujours sur le qui-vive, elle se tient généralement cachée dans les roseaux, hochant nerveusement de la queue lorsqu'elle se risque à découvert. Elle se signale le plus souvent par son cri d'effroi. Ce n'est qu'en hiver qu'elle s'aventure dans les ports, à la recherche de quelques miettes de pain sur les pontons, marchant telle une funambule sur les cordages des bateaux, s'agrippant avec ses longs doigts verts.

### Statut (en CH)

nicheur, migrateur et hivernant régulier, peu fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

1'000 - 2'500 (2004)

### Comportement migrateur

sédentaire et migrateur à courte distance

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur nocturne

### Taille (cm)

32-35

### Envergure (cm)

50-55

### Poids (g)

250-420

### Site de nidification

roseaux, végétation lacustre

### Nourriture

insectes, vers, limaces, végétaux, graines

### Groupe

Râles et Foulques

### Habitat

zones humides, lacs, cours d'eau



plumage juvénile (© Marcel Burkhardt)



## Grand Cormoran

*Phalacrocorax carbo*



plumage nuptial (© Marcel Burkhardt)



plumage internuptial (© Mathias Schäf)

### Informations

Chaque automne, l'arrivée des chapelets d'oiseaux noirs ondulant au ras de l'eau nous implique au-delà des montagnes dans la dynamique des lointains et fascinants écosystèmes marins. Le Grand Cormoran semble archaïque lorsqu'il déploie ses ailes en croix pour les sécher au vent, comme si son plumage était défectueux.

### Statut (en CH)

nicheur localisé, migrateur et hivernant régulier, fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

426 - 1'037 (2008-2012)

### Comportement migrateur

migrateur à courte distance

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne

### Taille (cm)

80-100

### Envergure (cm)

121-149

### Poids (g)

2000-2500

### Site de nidification

arbres, sol

### Nourriture

poissons

### Groupe

Cormorans

### Habitat

lacs, cours d'eau



## Grèbe castagneux

*Tachybaptus ruficollis*



plumage nuptial (© Ruedi Aeschlimann)

### Informations

Habitué des ports en hiver mais toujours de nature très craintive, le Grèbe castagneux plonge à la moindre alerte pour se réfugier dans la végétation ou sous la coque d'un bateau, d'où il peut ne laisser émerger que le bec. Au printemps, c'est son rire hystérique retentissant dans la roselière qui trahit le plus souvent sa présence, alors difficile à détecter visuellement. Petite boule de plumes sans queue surmontée d'un périscope, c'est le nain de la guildes des oiseaux d'eau piscivores, au point qu'il est souvent pris pour un poussin de canard par les promeneurs du bord du lac.

### Statut (en CH)

nicheur, migrateur et hivernant régulier, peu fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

600 - 800 (2004)

### Comportement migrateur

essentiellement migrateur à courte distance

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur nocturne

### Taille (cm)

25-29

### Envergure (cm)

40-45

### Poids (g)

100-200

### Site de nidification

nid flottant

### Nourriture

insectes, poissons

### Groupe

Grèbes

### Habitat

lacs, cours d'eau



plumage internuptial (© Beat Rüegger)



## Guêpier d'Europe

*Merops apiaster*



adulte (© Ruedi Aeschlimann)

### Informations

Amateur invétéré d'hyménoptères, cet oiseau multicolore aux allures d'insecte géant porte bien son nom. Seul représentant européen de sa famille, le Guêpier est la plus spectaculaire acquisition de l'avifaune nicheuse helvétique à la fin du XXe siècle. L'implantation de cette espèce d'origine africaine est significative du réchauffement climatique en cours et témoigne de la capacité des oiseaux à s'y adapter en colonisant de nouveaux territoires.

### Statut (en CH)

nicheur régulier, localisé; migrateur rare

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

19 - 42 (2008-2012)

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne et nocturne

### Taille (cm)

27-29

### Envergure (cm)

44-49

### Poids (g)

45-75

### Site de nidification

galeries creusées

### Nourriture


insectes

### Groupe

Guêpiers

### Habitat

gravières



## Héron cendré

*Ardea cinerea*



adulte (© Marcel Burkhardt)

### Informations

Grâce à ses formidables capacités d'adaptation, le Héron cendré a surmonté la haine des Hommes qui, jusqu'au début du XXe siècle, touchaient des primes pour fusiller les familles dans leurs nids. Son seul crime: manger du poisson. Aujourd'hui pardonné - ou presque - le grand échassier gris survolant la cité offre un spectacle rompant la monotonie du quotidien et nous rappelle que le monde sauvage est là, à notre porte. Sa haute silhouette svelte ou renfrognée, statufiée dans les champs et sur les talus de route jusque dans les banlieues, est connue de tous.

### Statut (en CH)

nicheur, migrateur et hivernant régulier, peu fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

1'300 - 1'400 (2004)

### Comportement migrateur

essentiellement migrateur à courte distance

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne et nocturne

### Taille (cm)

90-98

### Envergure (cm)

155-175

### Poids (g)

1600-2000

### Site de nidification

arbres, sol

### Nourriture

poissons, petits mammifères, amphibiens

### Groupe

Hérons, Butors, etc.

### Habitat

zones humides, lacs, cours d'eau, zone agricole, forêt



## Héron pourpré

*Ardea purpurea*



adulte (© Marcel Burkhardt)


### Informations

Le plus coloré des hérons est pourtant l'un des plus discrets, se fondant à merveille dans les roseaux. Son destin est intimement lié à celui des vastes étendues marécageuses qui lui sont indispensables et qui malheureusement disparaissent petit à petit dans toute l'Europe. Son cou serpentiforme, son corps étroit et élancé et ses immenses doigts sont autant d'adaptations à la vie dans les roseaux. Il faut le rechercher surtout fin avril et début mai lorsqu'il a plu en seconde partie de nuit, ce qui incite les migrateurs à se poser.

### Statut (en CH)

nicheur irrégulier, migrateur régulier, peu fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

0 - 5 (2008-2012)

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne et nocturne

### Taille (cm)

78-90

### Envergure (cm)

120-150

### Poids (g)

600-1200

### Site de nidification

roseaux

### Nourriture


poissons, petits mammifères, amphibiens

### Groupe

Hérons, Butors, etc.

### Habitat

zones humides, lacs, cours d'eau



## Hirondelle de rivage

*Riparia riparia*



adulte (© Jari Peltomäki)


### Informations

La sémillante Hirondelle de rivage semble compenser sa petite taille par une frénésie de tous les instants. Il lui en faut en effet de l'énergie pour creuser, avec comme seuls outils ses pattes minuscules, la profonde galerie qui abritera son nid, transformant en «gruyère» les falaises sablonneuses. La correction infligée aux rivières, au propre comme au figuré, lui a fait perdre ses habitats naturels façonnés par l'érosion fluviale, rendant l'espèce dépendante de l'excavation des dépôts d'alluvions par l'Homme.

### Statut (en CH)

nicheur régulier, peu fréquent; migrateur fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

4'000 - 4'750 (2012)

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne

### Taille (cm)

12-13

### Envergure (cm)

27-29

### Poids (g)

12-18

### Site de nidification

galeries creusées

### Nourriture

insectes

### Groupe

Hirondelles

### Habitat

gravières, cours d'eau



## Hypolaïs polyglotte

*Hippolais polyglotta*



adulte (© Ruedi Aeschlimann)

### Informations

La ritournelle de cette hypolaïs est ponctuée d'imitations talentueuses, qui lui ont valu son nom. Typique des garrigues méditerranéennes, elle atteint dans les régions chaudes et ensoleillées de Suisse la limite septentrionale et orientale de son aire de nidification.

### Statut (en CH)

nicheur et migrateur régulier, peu fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

300 - 500 (2004)

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur nocturne

### Taille (cm)

13-14

### Envergure (cm)

18-20

### Poids (g)

9-16

### Site de nidification

buissons

### Nourriture

insectes

### Groupe

Fauvettes et alliés

### Habitat

gravières, terrains vagues, haies



## Loriot d'Europe

*Oriolus oriolus*



mâle (© Jari Peltomäki)



femelle (© Tomi Muukkonen)

### Informations

Malgré son appel flûté, un brin provocateur, qui le situe dans la frondaison des arbres, le Loriot évoluant dans la canopée comme un poisson dans l'eau demeure souvent insaisissable. C'est à son arrivée, dans les derniers jours d'avril et les premiers de mai qu'il faut le rechercher, avant que les chênes n'aient débourré les feuilles qui le rendront invisible, malgré sa taille de merle et ses couleurs vives. Avec un tel plumage il ne saurait démentir son origine tropicale, et c'est bien dans les forêts équatoriales d'Afrique qu'il passe les trois quarts de son temps, aux côtés d'espèces sosies sédentaires.

### Statut (en CH)

nicheur et migrateur régulier, peu fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

1'000 - 2'000 (2004)

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur surtout nocturne

### Taille (cm)

22-25

### Envergure (cm)

44-47

### Poids (g)

65-67

### Site de nidification

arbres

### Nourriture

insectes, araignées, fruits

### Groupe

Loriots

### Habitat

forêt de feuillus



## Martin-pêcheur d'Europe

*Alcedo atthis*



mâle (© Ruedi Aeschlimann)

### Informations

Le bel alcyon turquoise avait, selon la croyance des Anciens, le pouvoir d'apaiser la tempête et de porter bonheur aux hommes. Pour ceux qui en douteraient, les couleurs chatoyantes du Martin-pêcheur n'en apportent pas moins une touche d'exotisme détonante au sein de notre avifaune aux tons pastel; c'est l'unique représentant européen d'une grande famille tropicale. Belliqueux envers ses congénères mais d'un naturel très timide, il semble vouloir échapper en permanence aux regards qu'il attire.

### Statut (en CH)

nicheur, migrateur et hivernant régulier, peu fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

300 - 350 (2004)

### Comportement migrateur

sédentaire et migrateur à courte distance

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne et nocturne

### Taille (cm)

16-17

### Envergure (cm)

24-26

### Poids (g)

40-45

### Site de nidification

galeries creusées

### Nourriture

poissons

### Groupe

Martins-pêcheurs

### Habitat

lacs, cours d'eau, zones humides



## Martinet à ventre blanc

*Apus melba*



adulte (© Ruedi Aeschlimann)

### Informations

Du premier jour du printemps au dernier de l'été, les joyeuses bandes de Martinets à ventre blanc déboulant en trombe animent de leurs rires hystériques le coeur des vieilles cités. Ce martinet géant aux allures de petit faucon est réparti en deux castes qui occupent des niches bien distinctes: celle des montagnes et celle des villes. L'arc alpin marque la limite nord de l'aire de nidification de l'espèce dans son habitat rupestre originel, alors que des colonies citadines se sont implantées plus au nord, dans une quarantaine de villes du Plateau.

### Statut (en CH)

nicheur et migrateur régulier, peu fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

2'000 - 2'300 (2012)

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne et nocturne

### Taille (cm)

20-23

### Envergure (cm)

51-58

### Poids (g)

80-120

### Site de nidification

bâtiments, anfractuosités rocheuses

### Nourriture

insectes, araignées

### Groupe

Martinets

### Habitat

agglomérations, falaises



## Pic épeichette

*Dendrocopos minor*



mâle (© Jari Peltomäki)



femelle (© Jari Peltomäki)

### Informations

Nain parmi les pics, l'Epeichette évoque plutôt un passereau lorsqu'il voltige dans la canopée. Sa petite taille et son agilité en font le spécialiste des acrobaties sur les branches les plus fines et les plus hautes, aussi bien à l'aise à l'envers qu'à l'endroit. Il est si léger qu'il peut escalader une canne de roseau sans la faire fléchir, ce qu'il fait volontiers en hiver à la recherche d'insectes logés dans le creux des tiges. Sans complexe pour son bec minuscule, il n'en tambourine pas moins avec une force et une détermination vindicatives.

### Statut (en CH)

nicheur sédentaire peu fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

2'500 - 3'000 (2004)

### Comportement migrateur

sédentaire

### Taille (cm)

14-15

### Envergure (cm)

25-27

### Poids (g)

18-22

### Site de nidification

cavités d'arbres

### Nourriture

insectes

### Groupe

Pics

### Habitat

forêt, vergers, zones humides, agglomérations



## Pie-grièche écorcheur

*Lanius collurio*



mâle (© Ruedi Aeschlimann)



femelle (© Ruedi Aeschlimann)

### Informations

La croyance populaire voulait que la Pie-grièche écorcheur imitât les chants et les cris des petits passereaux pour les attirer dans le but inavouable de leur percer le cœur sur des épines et de les dévorer. Un naturaliste d'antan écrivait: «Voyez, son bec est crochu; ce masque noir ne peut que dissimuler une rare scélératesse...». Cette amplification anthropomorphique est bien loin de la réalité, l'espèce étant insectivore et le pot-pourri bredouillé par le mâle n'ayant d'autres buts que de délimiter son territoire et de séduire une femelle.

### Statut (en CH)

nicheur et migrateur régulier, fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

20'000 - 25'000 (2004)

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur nocturne

### Taille (cm)

16-18

### Envergure (cm)

24-27

### Poids (g)

21-40

### Site de nidification

buissons

### Nourriture

insectes, petits mammifères

### Groupe

Pies-grièches

### Habitat

haies, lisières



## Pipit farlouse

*Anthus pratensis*



adulte (© Beat Rüegger)

### Informations

Si la qualité musicale de son chant est légèrement moindre que celle du Pipit des arbres, qu'il côtoie souvent, son vol nuptial excelle d'autant: le vol en cloche du mâle de Pipit farlouse se termine par une chute spectaculaire, à peine mieux retenue que celle d'un volant de badminton par ses ailes et sa queue relevées à la verticale. C'est le plus fidèle et le plus typique habitant de nos dernières tourbières de montagne, auxquelles il est particulièrement lié.

### Statut (en CH)

nicheur régulier, peu fréquent; migrateur fréquent; hivernant peu fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

500 - 500 (2004)

### Comportement migrateur

migrateur à courte distance

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur diurne

### Taille (cm)

14-15

### Envergure (cm)

22-25

### Poids (g)

16-25

### Site de nidification

sol

### Nourriture

insectes, araignées

### Groupe

Pipits et Bergeronnettes

### Habitat

zone agricole



## Pouillot de Bonelli

*Phylloscopus bonelli*



adulte (© Beat Rüegger)

### Informations


Ni le vent ni l'ardeur du soleil de l'après-midi ne découragent le sibilant Pouillot de Bonelli, le seul qui semble vouloir résister à l'apathie réduisant les autres oiseaux au silence.

Méditerranéenne par excellence, l'espèce est typique des vallées alpines balayées par le foehn au microclimat chaud et sec, la Suisse étant proche de la limite nord de son aire de nidification. Son teint est d'autant plus blafard que c'est sur les éboulis des coteaux baignés de lumière qu'il trouve son meilleur biotope, se cantonnant de préférence dans les pins.

### Statut (en CH)

nicheur et migrateur régulier, fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

15'000 - 30'000 (2004)

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur nocturne

### Taille (cm)

11-12

### Envergure (cm)

16-20

### Poids (g)

7-9

### Site de nidification

sol

### Nourriture

insectes

### Groupe

Fauvettes et alliés

### Habitat

forêt



## Rossignol philomèle

*Luscinia megarhynchos*



adulte (© Marcel Burkhardt)

### Informations

Comme pour s'assurer du silence total de son auditoire, le Rossignol donne le meilleur de son bel organe en pleine nuit, le bec pointé vers le firmament, d'où descendra sa promesse. Mais qui peut se targuer de l'avoir vu, le célèbre roi des chanteurs qui a inspiré tant de poètes, enflammant les douces nuits de printemps de son chant vigoureux? S'il est aussi difficile à voir qu'il est prodigue de sa voix, c'est qu'il rechigne à se montrer, vivant caché dans le sous-bois des forêts riveraines, lui qui, pourtant, possède une robe d'un beau roux uniforme, qui ne demande qu'à être montrée.

### Statut (en CH)

nicheur et migrateur régulier, peu fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

2'000 - 2'500 (2004)

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur nocturne

### Taille (cm)

15-17

### Envergure (cm)

23-26

### Poids (g)

18-27

### Site de nidification

strate herbacée

### Nourriture

insectes, araignées

### Groupe

Merles, Grives et Traquets

### Habitat

forêt buissonneuse



## Rousserolle effarvate

*Acrocephalus scirpaceus*



adulte (© Mathias Schäf)

### Informations

Il n'est guère de roselière qui n'héberge sa Rousserolle effarvate au corps fuselé, se fauillant entre les cannes sans même les faire trembler. Peu exigeante, elle se contente parfois de massifs de roseaux de quelques dizaines de mètres carrés, ce qui en fait la plus abondante de nos fauvettes aquatiques. Musicalement peu inspirée, elle trahit sa présence par son chant guttural et monotone maladroitement scandé, totalement dépourvu de la virtuosité qui caractérise la Verderolle.

### Statut (en CH)

nicheur régulier, peu fréquent; migrateur fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

7'000 - 9'000 (2004)

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur nocturne

### Taille (cm)

12-14

### Envergure (cm)

17-21

### Poids (g)

10-15

### Site de nidification

roseaux

### Nourriture

insectes

### Groupe

Fauvettes et alliés

### Habitat

lacs, cours d'eau, zones humides



## Rousserolle turdoïde

*Acrocephalus arundinaceus*



adulte (© Marcel Burkhardt)


### Informations

La plus grande rousserolle européenne, qui doit son nom à sa ressemblance superficielle avec une grive, est aussi la plus rare des trois espèces indigènes. Plus méridionale que l'Effarvate, la Turdoïde était inconnue en Suisse jusqu'en 1880, année à partir de laquelle l'espèce a constitué une importante population sur la rive sud du lac de Neuchâtel notamment.

### Statut (en CH)

nicheur régulier, rare; migrateur peu fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

200 - 250 (2004)

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur nocturne

### Taille (cm)

19-20

### Envergure (cm)

25-29

### Poids (g)

25-37

### Site de nidification

roseaux

### Nourriture

insectes

### Groupe

Fauvettes et alliés

### Habitat

lacs, cours d'eau, zones humides



## Rousserolle verderolle

*Acrocephalus palustris*



adulte (© Ruedi Aeschlimann)

### Informations

Polyglotte par excellence, la Verderolle présente le répertoire le plus riche et le plus varié de tous les oiseaux européens, à l'exception de sa concurrente russe, la Rousserolle des buissons. L'écoute attentive de son chant plein d'exotisme est un émerveillement sans cesse renouvelé: il reproduit avec perfection celui de dizaines d'espèces d'oiseaux, mêlant savamment les voix environnantes de l'été à celles côtoyées dans les quartiers d'hiver tropicaux, les intégrant à ses propres motifs aux accélérations caractéristiques.

### Statut (en CH)

nicheur régulier, peu fréquent; migrateur fréquent

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

3'000 - 6'000 (2004)

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur nocturne

### Taille (cm)

12-14

### Envergure (cm)

18-21

### Poids (g)

11-15

### Site de nidification

roseaux

### Nourriture

insectes

### Groupe

Fauvettes et alliés

### Habitat

lacs, cours d'eau, zones humides



**Serin cini**  
*Serinus serinus*



mâle (© Mathias Schäf)

femelle (© Mathias Schäf)

**Informations**

Tel un petit soleil, notre canari sauvage rayonne de tous ses feux avec son plumage gorgé de lumière et son intarissable grésillement, dont il inonde nos jardins et vignobles. A l'image de son minuscule bec bombé, le plus petit représentant de la famille des fringilles semble vouloir arrondir les angles, tant ses moeurs sont douces et pacifiques. Franchement méditerranéen à l'origine, il a colonisé progressivement les plaines du centre et du nord de l'Europe tout en développant un comportement migrateur de plus en plus marqué.

**Statut (en CH)**

nicheur et migrateur régulier, fréquent; hivernant peu fréquent

**Calendrier annuel**



**Effectif en Suisse (couples)**

20'000 - 40'000 (2004)

**Comportement migrateur**

essentiellement migrateur à courte distance

**Migrateur diurne/nocturne**

Migrateur diurne

**Taille (cm)**

11-12

**Envergure (cm)**

20-23

**Poids (g)**

11-15

**Site de nidification**

arbres, buissons

**Nourriture**

graines

**Groupe**

Fringilles

**Habitat**

agglomérations, zone agricole, gravières



**Tarier des prés**  
*Saxicola rubetra*



mâle (© Marcel Burkhardt)



femelle (© Marcel Burkhardt)


**Informations**

S'accordant à merveille dans l'infinie palette de couleurs de la prairie fleurie, le plastron orange encadré de moustaches blanches du Tarier des prés est plus difficile à repérer que la jolie strophe ventriloque qu'il lance depuis la tige d'une ombellifère. Pour celui qui devine le drame qui guette sa nichée, ce crépitement joyeux s'assimile plutôt à un appel à l'aide.

**Statut (en CH)**

nicheur et migrateur régulier, fréquent, hivernant accidentel

**Calendrier annuel**



**Effectif en Suisse (couples)**

10'000 - 15'000 (2004)

**Comportement migrateur**

migrateur au long cours

**Migrateur diurne/nocturne**

Migrateur nocturne

**Taille (cm)**

12-14

**Envergure (cm)**

24-25

**Poids (g)**

16-24

**Site de nidification**

sol

**Nourriture**


insectes, araignées

**Groupe**

Merles, Grives et Traquets

**Habitat**

prairies et pâturages





## Torcol fourmilier

*Jynx torquilla*



adulte (© Mathias Schäf)


### Informations

Cet oiseau de sortilèges a plus d'un tour dans son sac, le plus étrange étant sa métamorphose en reptile: lorsqu'il se sent menacé, il allonge son cou, se contorsionnant et balançant sa tête désarticulée; si la ruse ne suffit pas à intimider le prédateur, il pousse l'imitation jusqu'à tirer la langue en sifflant, figurant un serpent prêt à l'attaque! Pic malgré lui, le Torcol s'est converti aux moeurs des migrateurs transsahariens.

### Statut (en CH)

nicheur et migrateur régulier, peu fréquent; hivernant accidentel

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

2'000 - 3'000 (2004)

### Comportement migrateur

essentiellement migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur nocturne

### Taille (cm)

16-17

### Envergure (cm)

25-27

### Poids (g)

30-45

### Site de nidification

cavités d'arbres

### Nourriture


insectes

### Groupe

Pics

### Habitat

vergers, zone agricole, agglomérations



## Tourterelle des bois

*Streptopelia turtur*



adulte (© Beat Rüegger)

### Informations

Qu'il est bon de se laisser bercer par le ronronnement de la Tourterelle des bois, cachée dans le vert tendre des feuilles à peine épanouies lors de son retour d'Afrique. Et pourtant, elle aura dû en surmonter des embûches pour rapporter ce message de paix: le désert, la mer, les montagnes, à quoi vient s'ajouter la folie destructrice des Hommes, qui s'acharnent à la tirer pendant son retour printanier, avec l'amusement pour seule justification!

### Statut (en CH)

nicheur et migrateur régulier, peu fréquent; hivernant accidentel

### Calendrier annuel



### Effectif en Suisse (couples)

1'000 - 2'500 (2004)

### Comportement migrateur

migrateur au long cours

### Migrateur diurne/nocturne

Migrateur nocturne

### Taille (cm)

26-28

### Envergure (cm)

45-50

### Poids (g)

100-180

### Site de nidification

arbres, buissons

### Nourriture

graines

### Groupe

Pigeons et Tourterelles

### Habitat

forêt, zone agricole



